

# 城南家保ニュース Vol. 20-12

熊本県城南家畜保健衛生所 平成21年 2月 発行




<http://www.pref.kumamoto.jp/site/179/>

電話 0966-22-3814、FAX 0966-22-3617

## 台湾で口蹄疫発生！

- 台湾の2農場で豚の口蹄疫が発生
- 本発生は2001. 2月以来
- 2003. 5月に台湾はワクチン接種清浄国に認定されていた
- 2008. 8月以降、台湾では段階的にワクチン接種を中止していた
- 口蹄疫の撲滅を確認するため、おとり豚を配置していた
- 両農場とも、ワクチン接種していない豚からウイルスが検出された
- 発生農場から半径3km以内のサーベイランスは完了し、新たな発生は見つかっていない
- 発生農場周辺の農場に対して緊急ワクチンの接種を行った
- 現在のところ、感染源として環境中に残存していたウイルスの可能性が高い



### 発生の概要

	発生日	畜種	農場	飼養頭数	淘汰頭数	ワクチン接種頭数
雲林県	2009/2/4	豚	1	68	68	31,950
彰化県	2009/2/9	豚	1	6,112	608	4,500

2009年2月23日掲載 動衛研：台湾における口蹄疫の発生より

## 1 口蹄疫とは

牛、豚などの偶蹄類が罹り、口内や蹄冠部に水疱ができるウイルス病です。この病気は、伝搬力が強く、国際的にも最も重要な家畜伝染病とされており、日本では法定伝染病また海外悪性伝染病に指定されています。

## 2 主な症状

- ① 著しい流涎（よだれ）、体重や乳量の減少。
- ② 舌・唇・歯ぐき・ツメの間・乳頭に水疱（みずぶくれ）を形成。

- ③ 水胞は、数日で破れ、ただれた様になる。
- ④ 死亡率は、5%程度（幼弱な家畜では50%）
- ⑤ ただれた部分に痛みを伴い、採食不能、起立不能から廃用または死亡するなど経済的被害が甚大なものとなります。

口蹄疫に罹った家畜の写真



牛の舌・唇の水胞・びらん



豚の蹄の水胞・びらん

### 3 感染経路

口蹄疫ウイルスに感染した家畜との接触、汚染された飼料（稲わら）肉、乳、加工品、敷料など全てのものが感染源となります。

### 4 予防対策

- ① 口蹄疫を疑う異常家畜を発見した場合、診療獣医師あるいは家畜保健衛生所に連絡すること。
- ② 農場、畜舎の出入り時の車両、長靴、作業服などの消毒を十分行うこと。
- ③ 家畜の状態をよく観察すること。
- ④ 残飯を給与する場合は、十分加熱すること。
- ⑤ 輸入の稲わら、乾草などの使用は可能な限り避けること。
- ⑥ 畜産関係者は、発生地域への農場視察旅行などは避けること。

異常な家畜を発見したら下記までご連絡ください。

熊本県城南家畜保健衛生所

電話 0966-22-3814

熊本県城南地区家畜自衛防疫促進協議会

電話 0966-28-3234