

阿蘇家保便り

平成27年2月号

熊本県阿蘇家畜保健衛生所

〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2639-1

TEL 0967-22-0041 FAX 0967-22-4612



岡山県、佐賀県で高病原性鳥インフルエンザ発生

平成27年1月15に岡山県笠岡市、1月18日に佐賀県西松浦郡有田町で高病原性鳥インフルエンザ（いずれもH5N8亜型）が発生しました（詳細は下記）。

No.	発生日	発生場所	畜種	飼養羽数	備考
1例目	H26.12.16	宮崎県延岡市北川町	肉用種鶏	約4,000羽	H5N8亜型
2例目	H26.12.28	宮崎県宮崎市高岡町	肉用鶏	約42,000羽	H5N8亜型
3例目	H26.12.30	山口県長門市日置中	肉用種鶏	約37,000羽	H5N8亜型
4例目	H27.1.15	岡山県笠岡市	採卵鶏	約200,000羽	H5N8亜型
5例目	H27.1.18	佐賀県西松浦郡有田町	肉用鶏(2農場)	約73,000羽	H5N8亜型

養鶏農家の皆様におかれましては、今一度**防鳥ネットの破損等が無いか点検**して頂くとともに、農場の入口での車両の消毒、**鶏舎周囲への石灰散布**等、農場への侵入防止徹底をお願いします。

また、万一異状が認められた際には速やかに家畜保健衛生所まで通報していただきますようよろしくお願いします。

食料・農業農村政策審議会家畜衛生部会 第50回家きん小委員会概要

平成27年1月18日（日）に第50回家きん疾病小委員会が開催されました。概要は以下のとおりです。

- ①発生農場及び関連農場のいずれにおいても、特定家畜防疫指針に基づき、一連の防疫措置を徹底すること。
- ②佐賀県有田町の事例は、これまでの4件の発生と同様に、死亡羽数の増加が比較的緩やかな傾向が認められているが、死亡羽数が通常の2倍以上に増加している。日常と異なる徴候が確認された場合には、速やかに通報することがまん延防止のために必要である。
- ③我が国での本病の発生状況や韓国、台湾等の近隣諸国での発生状況を踏まえると、全国どこの都道府県においても、発生リスクが高い。異常家きんの通報があった際の危機管理体制及び初動対応の徹底について改めて確認すること。


韓国で高病原性鳥インフルエンザが発生しています

2015年2月11日現在

韓国における高病原性鳥インフルエンザ (H5N8亜型)の発生状況 (2014年1月～)

韓国では、昨年1月、全羅北道高敞(コチャン)郡と扶安郡のアヒル農場で高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)が発生以来、継続しています。

2月11日現在、家きんでの確認件数は全羅南道(93件)、忠清北道(58件)、全羅北道(55件)などで**292件**となっています。また、2月野鳥における検査ではトモエガモ(10件)、マガモ(9件)、カルガモ(5件)、ヒシクイ(5件)など58件の発生が確認されており、まだ終息する兆しが全く見えない状況です。



近隣諸国における悪性伝染病発生情報

病名	発生地	発生日	畜種	型
口蹄疫	中国	1月8日	牛、豚	A
	韓国	1月2日～1月31日	牛、豚	O
高病原性鳥インフルエンザ		1月5日	家きん	H5N1
	中国	1月14日、25日	家きん	H5N6
		1月28日	家きん	H5N2
		1月6日～2月6日	家きん	H5N2
	台湾	1月8日～2月5日	家きん	H5N8
	1月11日～2月1日	家きん	H5N3	

2月16日現在