

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第3号

令和5年(2023年)10月24日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 長洲バイ水温 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
| 10年平均値 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 22.1 |
| R5年度 | | | 欠測 | | |

分析:熊本県水産研究センター
 協力:熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

| 海区 | 地区 | 区分 | 今回 ※満潮時刻(熊本) 16:34 | | | | | 参考:窒素量 | | 備考 | |
|-----|------|------|--------------------|---------|------|--------|----------|--------|--------------------|------|----------------|
| | | | 窒素量 | リン量 | 水温 | 比重 | 珪藻類 | 採水 | 10年平均値※ (10月下旬) | | 第2号 (10/17) |
| | | | μg-at/L | μg-at/L | °C | (ρ 15) | cells/ml | | | | |
| 有明海 | 荒尾 | 支柱 | 3.0 | 0.4 | 23.3 | 23.1 | 1,900 | 10/23 | 14:40 | 9.2 | 9.1 |
| | | ベタ | 1.6 | 0.3 | 23.3 | 23.0 | 2,500 | | 14:50 | 8.4 | 4.5 |
| | 熊本北部 | 支柱 | 1.5 | 0.3 | 22.8 | 23.3 | 4,400 | | 16:30 | 9.5 | 8.9 |
| | | ベタ | 1.5 | 0.2 | 23.0 | 23.3 | 5,800 | | 16:40 | 8.1 | 7.8 |
| | 岱明 | 支柱 | 13.5 | 1.0 | 22.8 | 24.0 | 85 | | 12:43 | 7.8 | 7.3 |
| | | ベタ | 3.3 | 0.5 | 22.9 | 23.5 | 1,200 | | 11:08 | 6.4 | 5.6 |
| | 大浜 | 支柱 | 1.2 | 0.0 | 22.2 | 23.7 | 9,400 | | 16:05 | 12.7 | 17.0 |
| | | ベタ | 8.9 | 0.7 | 22.8 | 24.5 | 300 | | 16:15 | 5.5 | 3.9 |
| | 河内 | 支柱 | 5.2 | 0.2 | 22.7 | 23.2 | 1,900 | | 14:30 | 14.3 | 17.5 |
| | | ベタ | 2.9 | 0.1 | 23.4 | 24.3 | 1,500 | | 14:20 | 9.2 | 4.6 |
| | 沖新 | 支柱 | 6.3 | 0.2 | 22.7 | 22.9 | 1,000 | | 16:30 | 7.3 | 4.9 |
| | | ベタ | 6.5 | 0.2 | - | 22.9 | 1,100 | | 16:30 | 5.4 | 4.4 |
| | 島口 | 支柱 | 12.3 | 0.6 | 22.7 | 24.0 | 340 | | 14:00 | 8.1 | 6.8 |
| | | ベタ | 1.9 | 0.1 | 23.4 | 24.6 | 4,500 | | 14:36 | 5.8 | 4.9 |
| 網田 | 支柱 | 19.8 | 1.2 | 22.0 | 23.9 | 40 | 12:10 | 8.1 | 5.6 | | |
| | ベタ | 21.8 | 1.4 | 21.2 | 23.7 | 17 | 12:10 | 7.0 | 4.2 | | |
| 平均 | 支柱 | 7.8 | 0.5 | 22.7 | 23.5 | | | | 9.6 | 9.6 | |
| | ベタ | 6.1 | 0.4 | 22.9 | 23.7 | | | | 7.0 | 5.0 | |
| | 全体 | 6.9 | 0.5 | 22.7 | 23.6 | | | | 8.3 | 7.3 | |
| 八代海 | 三角 | 支柱 | 1.0 | 0.6 | 21.5 | 22.8 | 620 | 10/23 | 16:00 | 7.3 | 4.9 |
| | 平均 | 全体 | 1.0 | 0.6 | 21.5 | 22.8 | | | | 7.3 | 4.9 |
| 熊本県 | 平均 | 支柱 | 7.1 | 0.5 | 22.5 | 23.4 | | | | 9.4 | 9.1 |
| | | ベタ | 6.1 | 0.4 | 22.9 | 23.7 | | | | 7.0 | 5.0 |
| | | 全体 | 6.6 | 0.5 | 22.7 | 23.6 | | | | 8.2 | 7.2 |

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類：アステリオネロプシス属、スケトネマ属等

※10年平均値は平成25年度から令和4年度の旬別平均とする。
 ただし、沖新は令和3年度からのため、2年平均とする。

