

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第8号

令和5年(2023年)11月28日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

| 長洲バイ水温 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10年平均値 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| R5年度 | 18.3 | 18.4 | 17.8 | 17.6 | 17.7 |

分析:熊本県水産研究センター
 協力:熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

| 海区 | 地区 | 区分 | 今回 ※満潮時刻(熊本) 8:55 | | | | | 参考:窒素量 | | 備考 | |
|-----|------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------|--------------------|------|----------------|
| | | | 窒素量 | リン量 | 水温 | 比重 | 珪藻類 | 採水 | 10年平均値※ (11月下旬) | | 第7号 (11/21) |
| | | | $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ | $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ | $^{\circ}\text{C}$ | ($\rho 15$) | cells/ml | | | | |
| 有明海 | 荒尾 | 支柱 | 5.9 | 0.6 | 16.9 | 23.6 | 550 | 11/27 | 8:40 | 8.1 | 8.0 |
| | | ベタ | 3.8 | 0.5 | 17.2 | 24.0 | 17 | | 8:50 | 6.4 | 5.2 |
| | 熊本北部 | 支柱 | 6.3 | 0.5 | 17.1 | 23.6 | 1,200 | | 9:00 | 7.3 | 9.1 |
| | | ベタ | 5.7 | 0.4 | 17.7 | 23.7 | 2,000 | | 9:00 | 8.1 | 12.0 |
| | 岱明 | 支柱 | 1.5 | 0.1 | 18.5 | 23.5 | 7,600 | | 9:21 | 9.3 | 11.0 |
| | | ベタ | 0.6 | 0.1 | 18.0 | 23.8 | 7,100 | | 9:27 | 10.2 | 5.6 |
| | 大浜 | 支柱 | 4.3 | 0.2 | 16.5 | 22.4 | 3,100 | | 8:55 | 16.7 | 20.2 |
| | | ベタ | 0.6 | 0.0 | 17.7 | 23.6 | 6,200 | | 9:05 | 10.5 | 9.5 |
| | 河内 | 支柱 | 20.0 | 0.3 | 16.4 | 20.3 | 15,000 | | 9:00 | 24.0 | 52.4 |
| | | ベタ | 1.9 | 0.1 | 17.2 | 23.3 | 8,500 | | 9:05 | 10.9 | 21.4 |
| | 沖新 | 支柱 | 7.3 | 0.2 | 17.9 | 23.0 | 7,900 | | 12:00 | 8.6 | 23.3 |
| | | ベタ | 6.4 | 0.4 | 18.8 | 24.0 | 2,700 | | 12:00 | 5.4 | 26.8 |
| | 島口 | 支柱 | 8.9 | 0.6 | 18.9 | 23.9 | 630 | | 8:47 | 12.6 | 18.5 |
| | | ベタ | 6.9 | 0.5 | 19.3 | 24.1 | 300 | | 8:30 | 12.1 | 17.3 |
| | 網田 | 支柱 | 6.8 | 0.6 | 18.2 | 24.5 | 7 | | 11/28 | 7:30 | 10.9 |
| ベタ | | 9.0 | 0.6 | 18.9 | 24.6 | 47 | 7:30 | 9.9 | | 15.1 | |
| 平均 | 支柱 | 7.6 | 0.4 | 17.6 | 23.1 | | | | 12.2 | 19.7 | |
| | ベタ | 4.4 | 0.3 | 18.1 | 23.9 | | | | 9.2 | 14.1 | |
| | 全体 | 6.0 | 0.4 | 17.8 | 23.5 | | | | 10.7 | 16.9 | |
| 八代海 | 三角 | 支柱 | 1.3 | 0.1 | 16.1 | 23.1 | 2,800 | 11/27 | 9:10 | 8.3 | 0.6 |
| | 平均 | 全体 | 1.3 | 0.1 | 16.1 | 23.1 | | | | 8.3 | 0.6 |
| 熊本県 | 平均 | 支柱 | 6.9 | 0.4 | 17.4 | 23.1 | | | | 11.7 | 17.5 |
| | | ベタ | 4.4 | 0.3 | 18.1 | 23.9 | | | | 9.2 | 14.1 |
| | | 全体 | 5.7 | 0.3 | 17.7 | 23.5 | | | | 10.5 | 15.9 |

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類:スケトネマ属等

※10年平均値は平成25年度から令和4年度の旬別平均とする。
 ただし、沖新は令和3年度からのため、2年平均とする。

