

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第3号

令和6年(2024年)11月6日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲バイ水温	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	分析: 熊本県水産研究センター
10年平均値	20.8	20.7	20.6	20.4	20.2	協力: 熊本県漁業協同組合連合会
R6年度	22.9	22.9	22.8	22.7	22.6	熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 10:51						参考:窒素量			備 考
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (11月上旬)	第2号 (10/29)	
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	12.5	0.9	22.5	23.6	28	11/5	11:35	6.6	8.1	
		ベタ	10.5	0.7	22.6	23.9	11		11:45	7.0	欠測	
	熊 本 北 部	支柱	12.9	0.9	22.2	24.0	18		10:23	6.6	9.3	
		ベタ	15.5	0.8	21.9	23.1	23		10:30	9.1	欠測	
	岱 明	支柱	14.4	0.9	22.2	23.8	27		11:18	6.5	9.4	
		ベタ	16.0	0.8	21.7	23.3	350		11:26	6.5	7.0	
	大 浜	支柱	19.1	1.1	22.5	22.9	36		11:00	10.1	15.8	
		ベタ	15.3	0.8	21.8	22.9	850		11:15	5.0	6.5	
	河 内	支柱	24.2	1.1	21.4	20.4	1	11:00	13.3	10.3		
		ベタ	18.3	1.0	22.0	22.1	45	11:05	8.3	7.2		
	松 尾	支柱	16.6	1.0	22.9	14.6	19	11/4	9:36	11.2	24.7	
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	11.3	欠測	
	沖 新	支柱	16.6	1.0	21.4	22.6	30	11/5	9:00	4.8	欠測	
		ベタ	14.7	0.9	21.3	22.6	28		9:05	3.3	欠測	
	畠 口	支柱	12.2	0.8	22.2	22.9	17		11:12	6.0	29.3	
		ベタ	12.8	0.9	21.9	23.6	15		11:02	4.5	欠測	
	網 田	支柱	8.0	0.6	22.8	23.7	17		12:01	9.8	4.1	
		ベタ※			23.1	24.6	3		11:59	5.8	7.0	
	平均	支柱	15.2	0.9	22.2	22.1				8.3	13.9	
		ベタ	14.7	0.9	21.9	23.1				6.7	6.9	
		全体	15.0	0.9	22.1	22.5				7.5	11.6	
八代海	三 角	支柱	16.3	1.2	21.8	23.3	46	11/5	11:00	5.6	18.4	
	平均	全体	16.3	1.2	21.8	23.3				5.6	18.4	
熊本県	平均	支柱	15.3	0.9	22.2	22.2				8.1	14.4	
		ベタ	14.7	0.9	21.9	23.1				6.7	6.9	
		全体	15.1	0.9	22.1	22.5				7.4	12.1	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
※珪藻類：スケレナ属、キートセラ属等
※今回、網田ベタ漁場は栄養塩が異常値である可能性があるので、掲載していません。

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

