

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第7号

令和6年(2024年)12月3日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲パイ水温	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2
10年平均値	17.7	17.5	17.3	16.9	16.5
R6年度	16.9	16.7	16.3	16.1	16.4

分析: 熊本県水産研究センター
協力: 熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 9:37						参考:窒素量		備考 ユーカンピア属 cells/ml	
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (12月上旬)		第6号 (11/26)
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	8.7	0.5	15.9	24.0	220	12/2	9:35	8.8	5.6	0
		ベタ	4.4	0.4	17.5	24.6	1,100		10:00	6.9	5.2	0
	熊 本 北 部	支柱	9.0	0.6	15.2	23.8	110		8:26	8.2	5.2	4
		ベタ	13.4	0.7	15.7	23.3	190		8:33	10.6	7.2	0
	岱 明	支柱	17.0	0.8	15.8	22.8	94		10:50	9.6	13.1	0
		ベタ	14.9	0.7	15.8	23.0	350		10:30	8.2	8.0	0
	大 浜	支柱	25.0	1.0	14.6	21.7	270		9:20	12.2	7.9	0
		ベタ	12.8	0.5	15.9	23.1	450		9:30	7.4	9.9	0
	河 内	支柱	25.2	1.0	14.1	21.4	180		9:00	16.8	9.7	0
		ベタ	18.7	0.8	14.9	22.2	160		9:05	10.1	7.0	18
	松 尾	支柱	欠測	－	－	－	－		－	20.9	54.8	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	16.9	9.6	－
	沖 新	支柱	10.7	0.5	17.0	23.8	400		15:00	12.6	21.9	4
		ベタ	13.9	0.6	16.1	23.4	230		15:00	7.4	12.0	0
	畠 口	支柱	7.0	0.4	17.5	24.9	590		9:29	12.4	14.7	0
		ベタ	13.4	0.6	16.4	23.2	200		9:05	7.7	13.0	0
	網 田	支柱	9.5	0.5	17.4	24.5	120		8:17	10.4	8.3	0
		ベタ	8.5	0.5	18.5	25.2	130		8:10	7.6	13.2	0
	平均	支柱	14.0	0.7	15.9	23.4			12.4	15.7		
		ベタ	12.5	0.6	16.4	23.5			9.2	9.4		
		全体	13.3	0.6	16.1	23.4			10.8	12.6		
八代海	三 角	支柱	8.4	0.6	16.2	22.9	32	12/2	9:40	12.3	5.8	0
	平均	全体	8.4	0.6	16.2	22.9			12.3	5.8		
熊本県	平均	支柱	13.4	0.7	16.0	23.3			12.4	14.7		
		ベタ	12.5	0.6	16.4	23.5			9.2	9.4		
		全体	13.0	0.6	16.1	23.4			10.9	12.2		

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
※珪藻類: スケトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

