

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第11号

令和7年(2025年)1月7日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲パイ水温	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6
10年平均値	12.0	11.9	12.0	12.0	12.2
R6年度	13.0	12.9	12.5	12.3	12.3

分析: 熊本県水産研究センター
協力: 熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 13:16						参考:窒素量		備考 ユーカンピア属 cells/ml	
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (1月上旬)		第10号 (12/24)
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	2.1	0.2	12.3	23.2	1,600	1/6	12:45	7.5	1.2	49
		ベタ	2.3	0.3	13.2	23.6	170		12:35	6.5	0.5	0
	熊 本 北 部	支柱	1.3	0.1	11.9	23.3	2,200		12:00	7.5	1.2	50
		ベタ	2.1	0.1	12.8	23.1	2,800		12:10	9.6	1.5	10
	岱 明	支柱	1.0	0.1	13.0	23.6	2,200		11:47	8.7	1.7	1
		ベタ	1.0	0.1	12.5	23.0	5,000		11:37	8.1	3.7	30
	大 浜	支柱	0.6	0.0	12.2	22.6	6,200		14:00	16.8	3.2	14
		ベタ	0.3	0.0	11.7	22.5	9,300		14:15	8.2	4.5	3
	河 内	支柱	3.1	0.1	11.3	22.0	7,300		10:50	17.4	7.3	5
		ベタ	0.4	0.0	11.6	23.0	7,500		11:00	10.2	3.4	0
	松 尾	支柱	欠測	－	－	－	－		－	16.9	8.3	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	14.9	3.4	－
	沖 新	支柱	1.1	0.0	欠測	22.8	4,300		12:00	3.5	5.6	0
		ベタ	0.6	0.1	欠測	23.2	5,200		12:00	3.5	12.3	12
	畠 口	支柱	1.1	0.0	13.3	23.2	5,000		13:40	11.4	2.0	11
		ベタ	0.6	0.0	13.0	23.7	3,700		13:52	10.2	3.2	2
	網 田	支柱	4.1	0.2	10.4	22.8	3,300		7:52	10.1	4.8	4
		ベタ	1.2	0.1	12.7	23.8	3,100		7:42	8.2	15.5	36
	平均	支柱	1.8	0.1	12.1	22.9			11.1	3.9		
		ベタ	1.1	0.1	12.5	23.2			8.8	5.3		
		全体	1.4	0.1	12.3	23.1			9.9	4.6		
八代海	三 角	支柱	2.3	0.3	11.8	22.1	350	1/6	13:30	4.1	5.0	0
	平均	全体	2.3	0.3	11.8	22.1			4.1	5.0		
熊本県	平均	支柱	1.8	0.1	12.0	22.8			10.4	4.0		
		ベタ	1.1	0.1	12.5	23.2			8.8	5.3		
		全体	1.5	0.1	12.2	23.0			9.6	4.6		

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上

※珪藻類: スケトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

