

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第17号

令和7年(2025年)2月18日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲パイ水温	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17
10年平均値	10.8	10.9	10.9	10.8	10.7
R6年度	9.6	9.5	9.6	9.9	9.9

分析: 熊本県水産研究センター
協力: 熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 11:25						参考:窒素量		備考 ユーカンピ ^ア 属 cells/ml			
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (2月中旬)		第16号 (2/13)		
								月日	時刻					
有明海	荒 尾	支柱	0.8	0.1	8.9	23.8	1,400	2/17	9:00	1.9	1.9	243		
		ベタ	欠測	欠測	－	－	－		－	3.1	0.8	－		
	熊 本 北 部	支柱	欠測	欠測	－	－	－		－	2.1	1.1	－		
		ベタ	欠測	欠測	－	－	－		－	1.8	0.9	－		
	岱 明	支柱	欠測	欠測	－	－	－		－	2.3	0.7	－		
		ベタ	欠測	欠測	－	－	－		－	2.6	1.0	－		
	大 浜	支柱	欠測	欠測	－	－	－		－	5.2	1.2	－		
		ベタ	欠測	欠測	－	－	－		－	2.4	1.2	－		
	河 内	支柱	0.9	0.0	9.2	22.2	14,000		9:07	9.3	1.5	610		
		ベタ	2.3	0.0	9.7	22.7	11,000		9:00	3.6	1.1	550		
	松 尾	支柱	欠測	欠測	－	－	－		－	欠測	※2.8	－		
		ベタ	欠測	欠測	－	－	－		－	欠測	※1.1	－		
	沖 新	支柱	欠測	欠測	－	－	－		－	9.7	※4.8	－		
		ベタ	欠測	欠測	－	－	－		－	2.5	※6.1	－		
	畠 口	支柱	欠測	欠測	－	－	－		－	4.8	1.8	－		
		ベタ	欠測	欠測	－	－	－		－	2.6	1.6	－		
網 田	支柱	0.6	0.2	11.1	24.2	2,800	10:58	2.2	2.5	78				
		ベタ	0.5	0.1	11.4	24.1					2,000			
	平均	支柱	0.8	0.1	9.7	23.4					10:48	3.1	1.5	109
		ベタ	1.4	0.1	10.6	23.4								
		全体	1.0	0.1	10.1	23.4								
	三 角	支柱	1.1	0.1	10.7	23.4					2,000	2/17	11:30	4.3
平均		全体	1.1	0.1	10.7	23.4								
熊本県	平均	支柱	0.8	0.1	10.0	23.4	4.6	1.6	2.7	1.1	3.7	1.4		
		ベタ	1.4	0.1	10.6	23.4								
		全体	1.0	0.1	10.2	23.4								

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上

※珪藻類: スケトネマ属、キートセロス属等

※参考欄の第16号の松尾、沖新の値は採水日が異なったため、平均値には含めていません。

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

