

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第19号

令和7年(2025年)3月4日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲パイ水温	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3
10年平均値	11.2	11.4	11.6	11.6	11.5
R6年度	10.5	10.8	11.2	11.7	11.5

分析: 熊本県水産研究センター
協力: 熊本県漁業協同組合連合会
熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 11:12						参考:窒素量		備考 ユーカンビア属 cells/ml	
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (3月上旬)		第18号 (2/26)
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	欠測	－	－	－	－	3/3	－	2.1	0.4	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	1.8	0.6	－
	熊 本 北 部	支柱	2.1	0.6	11.6	21.3	1,100		10:10	1.4	2.0	59
		ベタ	0.6	0.1	11.8	22.9	3,700		10:20	1.5	1.2	417
	岱 明	支柱	欠測	－	－	－	－		－	2.8	2.5	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	1.9	0.8	－
	大 浜	支柱	0.7	0.1	12.4	22.8	3,700		10:20	1.8	0.6	856
		ベタ	0.9	0.1	11.4	23.9	720		10:30	1.2	0.5	6
	河 内	支柱	2.3	0.1	12.7	22.4	1,700		10:15	5.4	4.6	371
		ベタ	1.3	0.0	13.7	22.7	1,300		10:00	3.5	0.7	195
	松 尾	支柱	欠測	－	－	－	－		－	10.3	欠測	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	2.3	欠測	－
	沖 新	支柱	欠測	－	－	－	－		－	4.8	0.7	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	1.8	0.9	－
	畠 口	支柱	欠測	－	－	－	－		－	5.5	1.3	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	4.0	1.0	－
	網 田	支柱	17.0	0.6	11.9	20.5	1,300	3/4	8:06	4.3	0.9	221
		ベタ	6.8	0.3	11.7	22.3	440		7:52	3.1	4.8	160
	平均	支柱	5.5	0.4	12.2	21.8				4.3	1.6	
		ベタ	2.4	0.1	12.2	22.9				2.3	1.3	
		全体	4.0	0.3	12.2	22.4				3.3	1.5	
八代海	三 角	支柱	欠測	－	－	－	3/3	－	4.9	2.7	－	
	平均	全体	－	－	－	－			4.9	2.7		
熊本県	平均	支柱	5.5	0.4	12.2	21.8				4.3	1.7	
		ベタ	2.4	0.1	12.2	22.9				2.3	1.3	
		全体	4.0	0.3	12.2	22.4				3.4	1.5	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上

※珪藻類: スケトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。
ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

