

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第21号

※今回をもって、

令和6年度の調査を終了します。

令和7年(2025年)3月18日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲パイ水温	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17
10年平均値	12.5	12.7	12.7	12.7	12.7
R6年度	12.0	11.9	11.8	11.6	11.1

分析: 熊本県水産研究センター

協力: 熊本県漁業協同組合連合会

熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 10:29						参考:窒素量		備考 ユーカンピア属 cells/ml	
			窒素量 μg・at/L	リン量 μg・at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (3月中旬)		第20号 (3/11)
								月日	時刻			
有明海	荒 尾	支柱	欠測	－	－	－	－	3/17	－	2.4	2.0	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	2.2	1.7	－
	熊 本 北 部	支柱	欠測	－	－	－	－		－	1.1	3.9	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	5.6	9.5	－
	岱 明	支柱	1.8	0.3	10.4	24.2	170		10:00	1.4	2.0	2
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	3.0	3.3	－
	大 浜	支柱	欠測	－	－	－	－		－	6.8	6.5	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	3.6	2.4	－
	河 内	支柱	0.4	0.1	10.2	24.1	1,200		9:00	6.0	27.1	340
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	2.6	32.6	－
	松 尾	支柱	欠測	－	－	－	－		－	9.8	54.0	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	2.8	欠測	－
	沖 新	支柱	欠測	－	－	－	－		－	3.6	1.2	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	9.3	2.7	－
	畠 口	支柱	欠測	－	－	－	－		－	3.9	1.4	－
		ベタ	欠測	－	－	－	－		－	2.4	1.6	－
	網 田	支柱	2.1	0.2	10.8	23.7	460	3/18	7:50	2.2	1.1	13
		ベタ	3.4	0.3	10.4	23.7	360		7:41	1.7	1.6	9
平均	支柱	1.4	0.2	10.5	24.0				4.1	11.0		
	ベタ	3.4	0.3	10.4	23.7				3.7	6.9		
	全体	1.9	0.2	10.5	23.9				3.9	9.1		
八代海	三 角	支柱	3.7	0.4	12.3	23.7	86	3/17	10:30	4.6	5.7	43
	平均	全体	3.7	0.4	12.3	23.7				4.6	5.7	
熊本県	平均	支柱	2.0	0.3	10.9	23.9				4.2	10.5	
		ベタ	3.4	0.3	10.4	23.7				3.7	6.9	
		全体	2.3	0.3	10.8	23.9				4.0	8.9	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上

※珪藻類: スケトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成26年度から令和5年度の旬別平均とする。

ただし、松尾と沖新は調査年が異なるため、松尾は平成26年度から平成29年度の4年平均、沖新は令和3年度から令和5年度の3年平均とする。

