

発生指標	●	好適条件	1	準好適条件1	2	準好適条件2	3	準好適条件3	4	準好適条件4
	—	好適条件無	?	判定不能						

※ただし、3mを超える風(葉面が乾く)や、時間雨量3mmを超える雨(胞子が雨で流される。)があると濡湿時間の継続が打ちきりとなる場合がある
また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を超える晴天の日が続くと病斑が出ても小さな病斑しかでない。

[illegible]

発生指標	●	：好適条件	1	：準好適条件1	2	：準好適条件2	3	：準好適条件3	4	：準好適条件4
	－	：好適条件無	？	：判定不能						

※ただし、3mを越える風(葉面が乾く)や、時間雨量3mmを越える雨(胞子が雨で流される。)があると湿潤時間の継続が打ちき

[illegible]

令和7年度 いもち病感染好適条件(BLASTAM)判定結果

発生指標	●	:好適条件	1	:準好適条件1	2	:準好適条件2	3	:準好適条件3	4	:準好適条件4
	—	:好適条件無	?	:判定不能						

・好適条件(いもち病の感染に好適な気象条件)

湿潤期間中の平均気温が15～25度で、湿潤時間が10時間(22～25度)～17時間(15度)、直前の5日間の平均気温が20度を越え25度未満。

・準好適条件(好適条件に準ずる気象条件)

準好適条件1: 湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が20度未満。(前日までの**気温が低い**)

準好適条件2: 湿潤時間は10時間以上であるが、前5日間の平均気温が25度以上。(前日までの**気温が高い**)

準好適条件3: 湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15度～25度の範囲外。(当日の気温が不適)

準好適条件4: 湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い。(当日の湿潤時間が短い)

※準的好適条件1～準好適条件4は、重要度の順位ではない。したがって、準好適条件の数値の高低そのものに重要度の意味はない。

・好適条件無し

湿潤時間が10時間未満の場合

※ただし、3mを越える風(葉面が乾く)や、時間雨量3mmを越える雨(胞子が雨で流される。)があると湿潤時間の継続が打ちきりとなる場合がある

また、好適条件が現れていもち病に感染しても、気温が30度を越える晴天の日が続くと病斑が出ても小さな病斑しかでない。

[illegible]