

<2026>

有効積算温度によるチャノキイロアザミウマの羽化最盛期予測
(JPPネット利用)

1 計算結果 (7/22 現在) 茶樹用

地点名	本年(R8)		平年 (過去10年の平均)		平年差	
	第5世代	第6世代	第5世代	第6世代	第5世代	第6世代
鹿北	8月7日	8月25日	8月11日	8月30日	4日早い	5日早い
菊池	7月30日	8月16日	8月3日	8月21日	4日早い	5日早い
甲佐	8月1日	8月17日	8月3日	8月21日	2日早い	4日早い
水俣	7月28日	8月14日	8月1日	8月19日	4日早い	5日早い
上	8月3日	8月21日	8月7日	8月26日	4日早い	5日早い

※平年は2016年～2025年の実測値平均

2 設定条件

計算期間	2026年 1月 1日 ～2026年 10月 31日					
アメダス地点	鹿北・菊池・甲佐・水俣・上					
気象データ	毎正時データ					
未来のデータ	平年値 (7/22～)					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットしない			
	発育上限温度		発育上限温度以上を除く(設定する)			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発育零点	発育上限 温度	発育停止 温度	有効積算 温度
	1	第1世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	385.6日度
	2	第2世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	700.5日度
	3	第3世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1015.4日度
	4	第4世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1330.4日度
	5	第5世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1645.3日度
	6	第6世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	1960.2日度
	7	第7世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2275.1日度
	8	第8世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃	2590.0日度