

<2026>

有効積算温度によるチャノキイロアザミウマの羽化最盛期予測
(JPPネット利用)

1 計算結果

(9/16 現在)

果樹用

地点名	本年(R8)		平年 (過去10年の平均)		平年差	
	第8世代	第9世代	第8世代	第9世代	第8世代	第9世代
熊本	9月16日	10月9日	9月19日	10月12日	3日早い	3日早い
三角	9月20日	10月15日	9月26日	10月22日	6日早い	7日早い
本渡※	9月25日	10月25日	10月5日	11月1日以降※	10日早い	※
八代	9月21日	10月18日	9月24日	10月20日	3日早い	2日早い
水俣	9月19日	10月15日	9月26日	10月26日	7日早い	11日早い

※ 本渡では、計算上過去10年のうち4年は第9世代が発生していない。

2 設定条件

計算期間	2026年 1月 1日 ~2026年 10月 31日				
アメダス地点	熊本・三角・本渡・八代・水俣				
気象データ	毎正時データ				
未来のデータ	平年値(9/16～)				
気温補正	設定しない				
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットしない		
	発育上限温度		発育上限温度以上を除く(設定する)		
	発育停止温度		設定する		
	No.	設定名称	発育零点	発育上限 温度	発育停止 温度
	1	第1世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
	2	第2世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
	3	第3世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
	4	第4世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
	5	第5世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
	6	第6世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
	7	第7世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
	8	第8世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
	9	第9世代	9.7℃	33.0℃	35.0℃
			有効積算 温度		